¿Está el escroto de su toro congelado? ¡Lo debe verificar!

El Hablaganados 693: Los toros y el frío no es una mezcla buena

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

Caminar por un espacio amplio y abierto, el dolor agudo del aire congelado se adhiere a la cara de uno como dagas, así que uno no puede sino preguntarse sobre el ganado y otros animales al aire libre.

Tener que asaltar la puerta de la oficina porque la cerradura estuvo congelada me hizo recordar que no todas las cosas funcionan bien en el frío. Los que han pasado por el frío de primera mano no necesitan ser recordados.

Las cosas sencillas, tales como intentar abrir la puerta del carro o intentar de enderezar el alambre de un par de pinzas para la batería, son recuerdos. Experimentar dedos lentos, fríos y torpes, dejar caer llaves del carro en la nieve o tener que sacar los guantes para recoger las llaves literalmente le hace a uno desesperarse. Aun hasta el punto de pensar: tal vez simplemente recogeré las llaves la próxima primavera.

De todos modos, hace frío. Hace mucho frío y ha estado muy, muy frío. La gente meteorológica nos dice que el índice de la sensación térmica recientemente llegó mucho más bajo de los 40 grados bajo cero.

Caminar por un espacio amplio y abierto, el dolor agudo del aire congelado se adhiere a la cara de uno como dagas, así que uno no puede sino preguntarse sobre el ganado y otros animales al aire libre. En realidad, los animales están mucho mejor preparados para el frío que nosotros. Hasta cierto punto, el frío ni es una preocupación para los que han adaptado y se han preparado. El abrigo natural de pieles adecuado ha crecido y provee aislamiento corporal excelente con tal de que el medio ambiente esté seco.

Para los productores de ganado, mucha de la atención incluye asegurarse de que el ganado esté seco y bien alimentado. El ganado genera calor al ingerir su comida, lo cual necesitan las vacas y becerros durante el invierno. Las vacas y becerros adaptan bastante bien, sacando calor de la manada, mientras se acuestan en un área de buena cama y protegida.

El ganado puede generar mucho calor. Cuando sea necesario, el ganado se acostará y hará cualquier esfuerzo para evitar el viento. Al llegar la mañana, las vacas se levantarán, tomarán bastante agua, encontrarán el heno y comerán y después pasarán el resto del día descansando y masticando su bolo.

Por otro lado, los becerros necesitan más protección del viento pero, si se les da buena cama y buena comida, harán bastante bien.

El desafío es más para el productor porque sacar los alimentos, la cama apropiada y mantener abierto el flujo de agua son una lucha. Al final del día, notablemente, el trabajo se cumple. Sin embargo, si hay un descuido, lo más probable es que será en el corral de toros.

Los toros a menudo se separan de la manada principal y no reciben el beneficio del ambiente de la manada en cuanto a la sobrevivencia. A menudo son más individualistas y no se animan a arrimarse para mantenerse abrigados. Parecen sobrevivir pero están a riesgo en el tiempo frío. El asunto más reportado es un escroto congelado. La situación no es muy rara pero de verdad es una crisis para el toro.

El escroto se diseña específicamente para dejar el calor salir del cuerpo y alejarse de los testículos. El toro no tolerará estas temperaturas frías sin cama buena y protección del viento. Los toros expuestos a la intemperie, en este caso el viento y el frío, pueden ser esterilizados al llegar la mañana.

En casos graves, cualquier testículo congelado significa que el toro no sirve. Afortunadamente, los testículos en sí por lo general no se congelan y el daño usualmente se limita al escroto. En tales casos, chequee sus toros por la hinchazón del escroto, seguido por el desprendimiento de piel muerta.

El calor del escroto inflamado realmente daña a la capacidad de la producción de esperma y de su almacenaje en el sistema reproductivo del toro, lo cual normalmente significa que el toro será infértil por algunos meses.

No hace falta decir que todos los toros deben tener un examen de salud reproductiva. Asegúrese que los toros se examinen a finales de marzo o a principios de abril mientras todavía hay bastantes ventas de toros para buscar reemplazos.

Como punto aparte, ¿está alimentando a sus toros? Pasamos tanto tiempo hablando de las vacas que a menudo los pobres toros se abandonan en el frío, literalmente. Claro, los toros pueden engrandecerse, con algunos que añaden 300 libras por año. Sin embargo, impedir su crecimiento y después esperar que sean fértiles en la primavera no es administración de toros realista.

Una rápida revisión de los datos de consumo de materia seca muestra que los toros más grandes y maduros deben estar comiendo de 40 a 50 libras o más de materia seca. Al subir de peso el toro, su alimento entregado fácilmente podría exceder 60 a 70 libras de forraje, dependiendo del método de alimentarlo.

Las libras serán aún mayores si le está dando a los todos alimentos más húmedos. Haga las calculaciones y asegúrese que sus toros tengan buena cama, que estén fuera del viento y que reciban la cantidad correcta de una ración equilibrada para el mantenimiento y crecimiento adecuados. Comuníquese con su nutricionista local.

Disfrute del frío porque va a ser un invierno largo.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina de NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.