




El Hablaganados 14: La clasificación sólida tiene sentido para la administración de ganado

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Tarde en el otoño es cuando las vacas necesitan estar en el rancho — y nunca tenemos bastantes corrales para separarlos efectivamente. Las caras conocidas se ven alimentándose y nuestros pensamientos de los becerros del año pasado y los pensamientos van hacia la preparación para los del año próximo.



Los primeros pensamientos son cómo separar esas vacas flacas de las demás y encontrar dónde darles y también a las jóvenes el cuidado extra. Para las que empiecen a parir el 1 de marzo, el 1 de diciembre es el principio del último trimestre de la gestación y trae consigo un aumento significativo en las necesidades nutricionales. Durante el trimestre medio, los productores dejan las vacas para alimentarse de sí mismas.

Al acercarse el último semestre, los días de comida barata se han acabado y los productores necesitan preparar las vacas para el parto. Las raciones de menos costo son apropiadas, pero no al costo de hacer sufrir el lado nutritivo. (Como punto de interés la fecha media para parir en Dakota de Norte es el 1 de abril, así que la mayoría de los productores todavía tiene de tres a cuatro semanas para prepararse para las exigencias de la nutrición durante el invierno.)

En el Centro de Investigación de Extensión Universitaria de Dickinson, los becerros empiezan a llegar al mundo el 1 de marzo. Se acabó el tiempo. Siempre me sorprende lo rápido que llega el tercer trimestre. Mientras preparamos para el último semestre, le doy las gracias a Dios por los paquetes nutricionales de antemano bien preparados para el condicionar que le están disponibles al productor. Ahorran el tiempo, algo que siempre nos hace falta.

Nuestra fecha de separación para la manada entera es el 5 de diciembre. Los becerros del año pasado se van para los corrales de alimentación el 12 de diciembre, así que noviembre y temprano en diciembre siempre son muy ajetreados. Esta es la última clasificación para las vacas de las cuales vamos a deshacernos. Vamos a dividir la manada según el marco de condición y la edad. Dando de comer a esos grupos (la condición moderada separada de la condición ligera y el viejo del nuevo) separadamente asegura la nutrición adecuada para todas las vacas. La mayoría de los productores llaman las vacas la manada. En realidad, se debe tomar en cuenta que esa manada se divide según la edad en muchos grupos.

Por lo general, las vacas que participan en CHAPS (Evaluación del rendimiento de la manada de ganado por Software) tienen un promedio de 5,4 años de edad. Ese número no cambia dramática desde hace veinte años. En 1998 la manada de ganado tenía por promedio 5,4 años de edad con una tasa reemplazo de 20% y 17,9% de matanza selectiva, resultando en un aumento ligero del tamaño de la manada.

¿Entonces, qué significa esto en cuanto a la distribución de la manada?

A través de los últimos veinte años, la manada típica de cien vacas tenía 17 vaquillas con su primer becerro, 15 con sus segundos becerros, 13 del cuarto año, 11 del quinto año, 10 de sexto año, 9 del séptimo año, 8 del octavo año, 6 del noveno año, 5 del décimo año, 3 de once años, 2 de doce años y una vaca que tiene trece años o más.

Para proveer las necesidades de cada grupo, sugerimos este plan para los corrales:

Corral #1 – para las 17 novillas de un año

Corral #2 – para las vacas de más de 10 años de edad, más las vacas con su segundo becerro, y las vacas flacas de cualquier edad con un marco de cuerpo de 4 o menos

Corral #3 – para el resto de la manada

Parece fácil decir que 17% de la manada (o más si tiene una tasa de reemplazo alta) son demasiados jóvenes para competir y está separado. A menudo olvidamos que el 11% de la manada es demasiado viejo para competir y 15% de la manada está recuperando todavía de su primero o segundo becerro.

Después de hacer las matemáticas, el segundo corral de separación contiene 26% de la manada antes de añadir las vacas flacas. Estas vacas necesitan más cuidado y más nutrición para asegurar que formen parte de la manada por muchos años.

Espero que usted encuentre todas sus etiquetas de oreja(caravanas).

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuxext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu