



El Hablaganados 15: Dé usted el cuidado especial a las vacas que tendrán tres años de edad. Lo necesitan

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

El puesto más difícil en la manada de ganado es el de la vaca con su primer becerro. Mientras ella desteta su primer becerro, ella tiene dos años y medio de edad. Ella tendrá tres años cuando llegue su segundo becerro y será la vaca más joven de la manada. Ella tiene la energía de la juventud pero su lugar dentro de la manada es el más bajo.

Después de un verano cuando ella puede correr por todas partes, de repente ella se encuentra en medio de las vacas mandonas y no sabe adónde ir. Su vida da un nuevo significado a la tensión: tiene que desafiar a las vacas más viejas cuando éstas tienen hambre y tiene que luchar para un lugar dónde acostarse. Las vacas viejas pesan más de 220 libras más que ella (más o menos 17%) y tienen más reservas de energía que ella en términos de condición de cuerpo.

Cow Age (Years)	Cow Weight	Cow Condition
2.5	1,082	4.9
3.5	1,184	5.0
4.5	1,255	5.0
5.5	1,279	5.1
6.5	1,301	5.2
7.5	1,304	5.2
8.5	1,299	5.2
9.5	1,286	5.1
10.5	1,265	5.0
11.5	1,267	4.9
12.5	1,236	4.7
13 +	1,206	4.4
Arg	1,249	5.3

Las vacas de primer becerro típicas tienen un marco de condición de 4,9, mientras las vacas maduras tendrán por promedio un marco de 5 o más. Añadir la experiencia a la fórmula para las vacas viejas y es fácil ver por qué esas vacas más jóvenes necesitan el cuidado especial.

Nadie quiere juntar las vacas jóvenes, las novillas, con las viejas. Lo mismo vale para las vacas de primer becerro que están llegando a tener los tres años. Es probable que esas vacas nunca vayan a estar más flacas hasta llegar a los 11 años. La estadística de los productores de Dakota de Norte que usan CHAPS (Evaluación del rendimiento de la manada de ganado por Software) desde 1979 muestran que esas vacas que van a parir por primera vez (que van a tener dos años y medio de edad a la vez que destetan su primer becerro) siempre tienen menos peso en el otoño, alcanzando 1.082 libras. El otoño es la estación de año más lógica para pesar las vacas y ése es el peso de que hablamos.

Los números demuestran las desventajas de las vacas más jóvenes. Los pesos y los marcos de condición son: las vacas de dos años pesaban 1.082 libras con el número de cuerpo de 4,9, las de tres años pesaban 1.184 con el número de cuerpo de 5, las de cuatro años pesaban 1.255 libras con el número de cuerpo de 5, las de cinco años pesaban 1.279 con el número de cuerpo de 5,1, las de seis años pesaban 1.301 con el número de cuerpo de 5,2 y las de siete años pesaban 1.304 con el número de cuerpo de 5,2.

Las vacas continúan creciendo hasta las siete años de edad. La condición de cuerpo es más constante y se nivela un año más temprano a los seis años de edad. Lo importante es recordar que cuando son novillas no son adultos y en realidad tienen siete años para crecer antes de que empiecen a perder peso. Lentamente las vacas se desarrollan hasta su peso máximo a las siete años de edad y entonces empiezan a perder peso hasta que se vayan de la manada. Las vacas de

catorce años pesan lo mismo como las de tres años en el otoño del año.

La condición de cuerpo es más constante y las vacas de seis, siete y ocho años todas tienen un número de cuerpo semejante. Sin embargo, a los once años de edad, el número de cuerpo es más típico para una vaca de dos años. Los números demuestran que hay que tratar ambas las vacas nuevas tanto como las viejas de manera semejante y hay que alimentarlas separadamente del resto de la manada para maximizar el rendimiento.

Hay algunos estudios que detallan la administración para las vacas viejas en cuanto a la producción de los becerros. La mayoría de las vacas viejas produce la grasa blanca o amarilla, pero eso es para otra vez. Continúe usted la clasificación de sus vacas; vale la pena.

Espero que usted encuentre todas sus etiquetas de oreja(caravanas).

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuxext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu