



## El Hablaganados 31: Clasificar según los números puede aliviar algunos de los problemas de los corrales de alimentación

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU  
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Como he mencionado varias veces este año, el Centro de Investigación de Extensión Universitaria en Dickinson de la Universidad del Estado de Dakota de Norte mandó 118 becerros al centro de alimentación. El informe sobre su progreso llegó hoy. Las estadísticas para los becerros cuentan cómo progresan y proveen información relativa a su genética.

Performance Update on Feedlot Steers NDSU Dickinson Research Extension Center	
Starting Weight (Dec. 15)	693 lbs
Current Weight (Mar. 6)	1027 lbs
Days in Feed	82
Average Daily Gain	4.07 lbs
Target Market Dates	
April 6	42
April 20	24
May 11	27
Remainder Dates	
Late April	11
Early May	13

A causa de que en esta región hay interés en alimentar el ganado, les voy a poner al día en cuanto al progreso de los becerros. Mandamos los becerros el 15 de diciembre. Por promedio, pesaban 693 libras, tenían 0,11 pulgadas de grasa de espalda y medían 46 pulgadas de alto en las caderas. Todos se alimentaban dentro de un corral hasta el seis de marzo, cuando los pesaron de nuevo y pasaron por el ultrasonido para medir la grasa de espalda como parte del sistema de administración de ganado electrónico (ECMS). Las estadísticas demostraron que ellos se engordaban bastante bien.

El 6 de marzo, el peso mediano de los becerros era 1.027 libras y tenían 0,34 pulgadas de grasa de espalda. Los becerros ganaron 334 libras en 82 días o 4,07 libras por día. Yo digo que todo va bien.

Usando el ECMS, las 117 cabezas de novillos se clasificaron y fueron separadas dentro de cinco corrales distintos que tenían fechas de blanco para el mercado, una oportunidad singular para maximizar su valor a la vez de minimizar los días que iban a requerir la alimentación.

Actualmente, 42 novillos deben ir al mercado el 6 de abril; 24 el 20 de abril; y 27 el 11 de mayo. Mediremos 11 de los y novillos restantes a los finales de abril y 13 más a principios de mayo.

Los ingresos serán buenos, con el peso de pagar del primer grupo de novillos tomado 113 días después de llegar a los corrales de alimentación y el segundo grupo 127 días después de llegar. A los finales de febrero, la cuenta para la alimentación que el Centro paga es \$16.082,20. Hasta ahora no hemos pagado nada y el primer grupo que se venderá va a cubrir esa cantidad y va a minimizar los cargos de interés.

Si usted está leyendo cuidadosamente, va a notar el número de inventario se bajó uno. Sí, un becerro, el número 0383 en el corral 50 murió a causa de problemas digestivos el 27 de febrero. Cuando uno alimenta al ganado, una tasa de muerte de 1% a 2% es inevitable. Sí, es posible evitar algunos problemas si no les da de comer a los becerros, pero estamos hablando de los corrales de alimentación.

Es el deber de los corrales de alimentación alimentar, y tratan de minimizar los problemas digestivos. Hasta hoy, el 19 de marzo, han alimentado a nuestro ganado 95 días. Un tasa de

pérdida por la muerte de 0,85% es muy buena. Tengo que recordar que el período de alimentación no se ha acabado todavía. Una muerte al final del período de alimentación nos cuesta más.

Desde el 28 de febrero, los becerros consumían 26 libras la cabeza por día con los costos totales a \$1,53 la cabeza por día. Esto es 4 centavos menos por día desde el informe pasado. El costo total actual de \$1,79 la cabeza por día es 2 centavos menos por día.

El rendimiento en los corrales de alimentación, tal como el comercio de ganado en su totalidad, debe guiarse según los datos. Cuando el Centro comenzó a alimentar el ganado, como sucede con la mayoría de los productores, me puse nervioso con cualquier desviación. Pero después de muchos años de recordar los costos individuales de ganancia y el rendimiento de los novillos, uno puede llegar a estar cómodo y puede evitar el sobre-reaccionar.

Por lo general, el comercio de ganado trae consigo ciertos riesgos, uno de los cuales es el riesgo financiero. No todo va a suceder suavemente, pero si uno mantiene los datos, es más probable que tenga éxito; no se puede administrar bien sin tomar las medidas necesarias; mantener la mente clara es más fácil si uno mantiene los datos.

Espero que usted encuentre todas sus etiquetas de oreja(caravanas).

Sus comentarios siempre son bienvenidos en [www.BeefTalk.com](http://www.BeefTalk.com). Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association( la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a [www.CHAPS2000.com](http://www.CHAPS2000.com) en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, [kringwal@ndsuext.nodak.edu](mailto:kringwal@ndsuext.nodak.edu)

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, [richard.mattern@ndsu.edu](mailto:richard.mattern@ndsu.edu)