



El Hablagaanados 110: Deshágase de las vacas jóvenes y flacas antes de que el invierno

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Hay muchos factores que influyen la administración de la manada de ganado cuando el estrés medioambiental la golpea. El calor de verano y la falta de humedad es en este momento el enfoque mayor para los productores de la región.

Laboratory Results of a Salt Water Spill NDSU Dickinson Research Extension Center	
Hydrocarbons - Crude Petroleum	Negative
Toxic and Heavy Metals	Negative
Excess Ions (sodium or potassium)	Positive
Excess Total Dissolved Salts	Positive

Para la vaca, los largos días calientes de verano son un intercambio marginal para los cortos días fríos del invierno. Sea como sea, necesitamos acordarnos que las vacas siempre están en un estado de transición. Ganan un poco y pierden un poco. Si ganan muchísimo, las vacas están contentas pero nuestro billetero no lo es. Si pierden demasiado, nadie está contento.

En un sentido general, los productores de ganado hablan a menudo de la manada, pero en realidad la manada se compone de varios grupos de ganado que tienen necesidades distintas. Las vacas más jóvenes (los animales de dos a tres años) deben administrarse separadamente cuando la comida es escasa. Aunque estas vacas son más pequeñas que las vacas maduras, tiene que consumir la misma cantidad de comida que las vacas mayores para continuar creciendo y reproduciendo al mismo tiempo. Deben estar separadas, juntas con las vacas flacas y las viejas, para poder consumir la comida adecuada.

Las vacas jóvenes también van a estar influenciadas por el comportamiento de las vacas más viejas. Aunque no son territoriales, las vacas más viejas ciertamente van a influenciar y colocar las vacas más jóvenes a su gusto. Aunque las vacas viejas y las más jóvenes tienen necesidades distintas, la condición general de todas las vacas se necesita monitorear. La mejor manera de calcular la condición nutricional de la manada es monitorear la condición de la vaca según la guía a continuación:

- . Las vacas flacas. Éstas están severamente escuálidas con todas las costillas y la estructura de los huesos fácilmente visibles, físicamente débiles y algún musculo todavía visible. Por lo menos en Dakota de Norte, aun cuando la comida es escasa, muy pocas vacas caen dentro de la categoría flaca.
- . Las vacas moderadamente condicionadas. Estas vacas más deseables todavía están flacas, con las costillas fácilmente visibles, pero sus hombros y cuartos traseros todavía muestran la musculatura buena a una apariencia suave por todo el cuerpo con alguna grasa en el pecho y por la cola, la cabeza y las costillas. Estas vacas son comunes a través del Medio Oeste.
- . Las vacas excesivamente condicionadas. Tienen un cuerpo muy bueno, el pecho lleno, la cola, la cabeza muestran bolsillos de grasa, la espalda parece cuadrada debido a la grasa, y las costillas son

muy suaves hasta obesas.

¿Cómo es la manada suya? A menudo, los números de condición se usan en los meses de invierno antes de criarlos animales para evaluar la condición nutritiva de la manada. Pero en el verano --- especialmente un verano seco --- es un buen tiempo de empezar a observar la condición de la vaca.

La mayoría de los fracasos reproductivos pueden rastrearse a la nutrición pobre, a pesar de las escaseces de verano e invierno. Las vacas que están flacas antes de parir tendrán el estro retardado. Cuando las pasturas están bajas y quedan flacas durante la lactancia tendrán tasas de concepción reducidas. Las temporadas de criar de 45 días son relativamente sin éxito, y no pueden mantenerse con las vacas flacas. El porcentaje de vacas abiertas o que paren tarde será excesivo. No se debe administrar la manada como un conglomerado grande. Busque activamente las vacas flacas e inicie planes administrativos que específicamente ponen como blanco las vacas flacas. La comida extra para moderar o condicionar excesivamente las vacas no tiene sentido, particularmente cuando hay una escasez de heno.

Para terminar, trate de hacer una situación negativa positiva. No tenga miedo de dejar los toros por más tiempo (en Dakota de Norte, el 4 de agosto es un buen día para quitarlos) que lo normal y captura de nuevo algún valor por vender las vacas preñadas, no las vacas de las cuales desea deshacerse. Muchos productores están retrasando el día de parir los becerros, así que algunas de las vacas que se preñaron más tarde todavía tienen valor como vacas productivas. Pero recuerde: las vacas flacas que son sanas y están preñadas pueden aumentarse de peso una vez que llegue la comida. No hay que reaccionarse demasiado.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuent.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu