



El Hablagaanados 117: ¿Las vacas flacas o las gordas, cuáles son mejores?

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Los becerros están destetados. Los novillos llenan los corrales de condición previa. Las novillas están esperando el transporte a los rastrojos de los cultivos y los campos de maíz. Las vacas están cediendo el control sobre sus becerros. Las vacas, mientras comen los rastrojos de cultivos y el maíz, están listas para su evaluación final ---guardarlas o deshacerse de ellas--- durante la última semana de noviembre.

Las vacas innecesarias necesitan procesarse con anticipación para tenerlas listas para las ventas de vacas preñadas, y otras vacas de las cuales usted desea deshacerse deben transportarse a las subastas.

El Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson no alimenta el ganado a término largo, y las vacas innecesarias que se van de los campos de maíz no necesitan quedarse en los corrales de engorde. Éste también es el tiempo en el cual tratamos las vacas para los parásitos externos. Las vacas se pesan, se verifican para la preñez y se reciben los tratamientos. Al salir de los pasadizos, las vacas se evalúan y se clasifican por el número de condición de cuerpo y son puestas en corrales por el invierno según su clasificación.

Cow Body Condition Scores	
Condition Score	Description
Thin	
1	Severely emaciated. Weak with no palpable fat.
2	Emaciated but not weak.
3	Very thin with prominent ribs, pin bones visible.
Moderate	
4	Thin with individual muscles, ribs and pin bones visible.
5	Moderate condition with ribs and muscles less apparent.
6	Good, with a smooth appearance throughout.
Fat	
7	Very good, with a full brisket and evidence of fat throughout.
8	Obese, with distended fat deposits.
9	Very obese fat.

Adapted from Wagner, Oklahoma State University MP 117

Aunque haya muchas maneras de administrar las vacas, si yo fuera a escoger una práctica administrativa como la superior, yo escogería clasificar las vacas. El síndrome de la vaca jefa sí existe. Las vacas en malas condiciones al principiar el invierno casi no tienen ninguna oportunidad para competir con las vacas acondicionadas mejor y más fuertes una vez que la nieve empieza a caer, la temperatura baja y su vientre empieza a llenarse de un becerro que crece rápidamente.

Prefiero utilizar los datos mismos; sin embargo, no estoy seguro que todos los datos hayan llegado cuando manejamos las vacas en preparándolas para el invierno. Hay un montón de preguntas sin respuestas. Por lo general, las vacas que entran el invierno en buenas condiciones físicas son las que salen del invierno en buenas condiciones. Asimismo, si se puede suministrarles a las vacas sus necesidades nutritivas diarias, entonces sólo necesitan estar de condición media y deben permanecer en tal condición.

En el mundo de la vaca, hay un dilema verdadero entre recibir las necesidades diarias y la necesidad de ahorrar la grasa para esos días en los cuales no las recibe. ¿Cuántos productores pueden garantizar las necesidades nutritivas diarias?

En el Centro, no podemos proveer ese requisito, así que la pregunta se hace con qué frecuencia podemos, y cuánta grasa debe guardar la vaca para pasar bien por esos días cuando la nutrición no es adecuada. Si una vaca pierde un punto de condición, el impacto realmente depende de la

condición que tenía al comienzo.

A fin de cuentas, el crisis para las vacas de condición pobre llega cuando las demandas más poderosas llegan cuando el becerro nace y la vaca empieza a producir leche. Ahora la vaca necesita trabajar, y desafortunadamente, la habilidad de separarlas vacas flacas del resto de la manada se disminuye rápidamente al progresar la temporada de los becerros.

La vaca jefa todavía es la jefa, y con un becerro nuevo a su lado, las oportunidades para la vaca flaca para alcanzar la preparación de la jefa se disminuyen cada vez más. ¿Entonces cuánto debe ganar una vaca en el otoño?

Después de la discusión sobre utilizar las vacas en los campos de maíz, Chip Poland, el nutricionista de Centro añadió "Calcular la ventaja o desventaja de ganar 191 libras y 2,5 unidades de condición de cuerpo tendrá que esperar para otro día."

Claramente, 2,5 unidades de condición de cuerpo parecen excesivas para la utilización eficaz del maíz; no obstante, todavía estamos investigando la cantidad correcta con la esperanza de equilibrar la cantidad necesaria de condición con el uso efectivo de un sistema de producción de carne no tan intenso en cuanto al trabajo. Por ahora, el blanco todavía permanece: ¿Cómo podemos obtener la condición moderada o buena para todas las vacas sin tener las que están demasiado flacas o gordas? Nadie nunca dijo que dar en un blanco en moción es fácil?

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuent.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu