El Hablaganados 308: La comprueba de la preñez temprana de vacas puede crear nuevas opciones para el marketing

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado
Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard,
Dickinson State University

Cada verano deja su huella. Para este verano es el calor. La hierba está secándose, las cosechas están muriéndose y el ganado empieza a rondar. Si no fuera por las moscas, las manadas estarían aún más dispersas, pero el irritante constante hace que las manadas se congreguen para buscar alivio.

Pero, el problema sigue, los pastos están secos. ¿Qué debe hacer el productor?

Obviamente, algunas etiquetas para las moscas no harían daño, pero lo más importante ahora es la sequía, y la primera inclinación es el reducir los números y buscar el alimento. El buscar el alimento sucederá de todos modos, y lo más difícil es decidir cuándo juntar las vacas y decidir cuáles irán al mercado.

Un cambio de manejo no es nada en que el productor piensa ni algo que acepta fácilmente. Sin embargo, los años como éste representan una buena ocasión para pensar en cambiar algunos de los procedimientos de manejo tradicionales.

Uno de los primeros cambios podría ser cambiar el horario otoñal para averiguar la preñez. Ahora mismo podría ser el tiempo para examinar las vacas para la preñez. ¿Se debe hacer esto ahora mientras las vacas todavía están en los pastos?

Sí, la hora es ahora, pero encontrar una hora más fría puede ser el desafío mayor. El resultado posible puede ser que los productores puedan separar las vacas en grupos: las que concibieron dentro de los primeros 25 días de la estacón de parir, las que concibieron dentro de los segundos 21 días y las que parirán más tarde o que no producirán becerros. Hay que llamar a su veterinario local y fijar una fecha para el ultrasonido.

Para el Centro de Investigación de Extensión Universitaria de Dickinson, el grupo principal de las vacas se inseminaron artificialmente el 16 de junio. La bateria(grupo) principal de toros se soltaron a los pastos a la vez que las vacas que no se inseminaron artificialmente. Los datos del Centro sugiere que el juntar las vacas darles el ultrasonido tiene mayor eficacia cuando los fetos más desarrollados están entre los 70 y 75 días de edad.

Los becerros(fetos) pueden estar divididos fácilmente dentro de períodos de concepción deseados de 21 días para cumplir con las expectativas de manejo. Se puede designar un grupo de vacas como el que concibió durante los primeros 21 días del ciclo de criar. También se puede determinar el segundo grupo de vacas como el que concibió durante los segundos 21 días del ciclo.

Esta estrategia funciona porque esas vacas llevan la preñez de 29 a 50 días todavía están detectables por el ultrasonido, y así también las de 51 a 72 días. Estos grupos se identifican para el productor. Las vacas restantes, las del tercer período de 21 días o más, constituyen el tercer grupo.

La estación de criar no se ha terminado todavía. Las vacas que no estarán preñadas en el otoño no se conocen, pero las opciones se han creado y se puede hacer algunas decisiones. Para algunos casos, sabiendo cuáles vacas parirán más tarde puede ser más deseable desde el punto de vista de que van a necesitar menos comida cosechada que esas vacas que se concibieron durante los primeros 21 días del ciclo de concebir.

A pesar de las decisiones a las cuales llega el productor, se necesitan las vacas preñadas en algún lugar. La meta es vender o reducir el tamaño de la manada para encuadrarse con la comida disponible y hacer esto de una manera planeada y no de una manera reaccionaria.

Su veterinario local puede ayudar. A la vez que fijan una fecha para el ultrasonido, vacune los becerros y prepárese para un destete temprano potencial si las cosas se empeoran.

No se olvide asegurar que los becerros tengan las etiquetas electrónicas también porque parece que las preparaciones para el mercado serán tempranas este año. Haga la llamada; valdrá la pena. Por cada día que una vaca no está preñada, 2,3 libras de ingresos de becerro se pierden y la comida continúa desapareciéndose.

Espero que usted encuentre todas sus etiquetas de oreja.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association (la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103,
kringwal@ndsuext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136,
richard.mattern@ndsu.edu

Mark Your Calendar

Schedule Your Cow Pregnancy Check

Cow Bred ..... June 16

Ultrasound ..... August 25

Early Cow Pregnancy Check Can Create Marketing Options

By Kris Ringwall
Extension Beef Specialist
NDSU Extension Service

And the heat hangs on.

Each summer leaves its mark. This year it is the mark of heat. The grass is drying, the crops are dying and the cattle are starting to roam. If it wasn't for flies, the herds would be more dispersed, but the constant irritation tends to force the herds to congregate for some relief.

The point still remains – the pastures are dry. So what should a producer do?

Obviously some fly tags wouldn't hurt, but the point at hand is the drought, and the first inclination is to reduce numbers and look for feed. The search for feed will happen regardless, but the real difficult point is when does one start thinking of gathering cows and sorting some for market.

A management change is not something that producers think about or easily accept. Yet, years like this are a good time to think of altering some old standby management procedures.

One of the first changes might be to change the timing of the fall pregnancy check. Now might be the time to pregnancy check cows. Should it be done now in 100-degree heat while the cows are out on pasture?

Yes, now is the time. The possible outcome might be that producers may be able to group cows into those that conceived the first 21 days of the breeding season, those that conceived the second 21 days of the breeding season and those that will be later-calving or open. Call your local veterinarian and arrange an ultrasound date.

At the Dickinson Research Extension Center, the main group of cows was artificially inseminated on June 16. The main bull battery was turned out at the same time to cows that were not artificially inseminated. The center's data in pregnancy checking suggests that bringing the cows in for an ultrasound when the oldest fetuses are at 70 to 75 days works great.

Calves (fetuses) can be sorted easily into the desired conception periods of 21 days, so the management expectation can be met. One group of cows can be designated as having conceived during the first 21 days of the breeding cycle. The second group of cows, conceived during the second 21 days of the breeding cycle, also can be determined.

The reason this strategy works is that those cows carrying a pregnancy from 29 to 50 days are still detectable by ultrasound, along with the pregnancies that are 51 to 72 days. These groups are identified for the producer. By default, those cows bred during the third 21-day period or later also are now known.

The breeding season is not done. Cows that will be open in the fall are not known, but options have been created and decisions can be made. In some cases, knowing those cows predicted to calve later may be more desirable from the standpoint of needing less harvested feed than those cows that conceived in the first 21-day breeding cycle.

Regardless of the choices a producer makes, pregnant cows are needed somewhere. The goal is to market or reduce the herd numbers to match feed resources and to do that in a planned way and not a reactionary way.

Your local veterinarian can help. At the time the cows are scheduled for their ultrasound, vaccinate the calves and prepare for the potential of early weaning if things get worse.

Don't forget to make sure the calves are electronically tagged as well because market preparations seem to be early this year. Make the call; it will be worth it. For every day a cow is open, 2.3 pounds of calf income is lost and the feed just keeps disappearing.

May you find all your ear tags.

Your comments are always welcome at www.BeefTalk.com. For more information, contact the North Dakota Beef Cattle Improvement Association, 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 or go to www.CHAPS2000.com on the Internet. In correspondence about this column, refer to BT0308.