

El Hablaganados 605: Planee con anticipación en vez de reaccionar; venda las vacas infértiles

[[previo](#)] [[próximo](#)] [[versión impresor](#)] [[inscripción](#)]

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

Tal como los toros, las vacas abiertas simplemente comen bien, compiten mejor y producen grasa.

Ahora es el tiempo de pensar en precisamente cuántas parejas vaca-becerro se deben soltar al pasto. Las tasas de uso y fechas de pastoreo ya deben haber sido planeadas y fijadas.

Sin embargo, las predicciones de la falta de lluvia necesitan ser aplicadas al plan y las tasas de uso ajustadas para acomodar menos forraje potencial.

Otro asunto del cual los productores necesitan recordar es que el tiempo bonito, temprano no significa extender el período de pastoreo y dejar salir temprano a las vacas y los becerros. La tentación de verdad está presente, pero no lo haga.

El pasto, tal como cualquier cosa viviente, necesita estar listo cuando se suelta el ganado para pastorear si uno espera maximizar la cosecha potencial. El pastoreo temprano no eleva la productividad del pasto. Por lo menos en el suroeste de Dakota del Norte, el primero de mayo es una fecha buena, tradicional para soltar el ganado en el pasto de la temporada fresca. El primero de junio es una fecha buena para el ganado para empezar en los pastos nativos de verano.

Cada lugarcito en el mundo tiene su propia fecha más adecuada para soltarlos, así que siempre consulte con los a su alrededor para ver si está sincronizado con el mejor tiempo.

Hay una pregunta obvia. ¿Cómo puede uno lograr el mejor rendimiento del pasto del pastizal? La respuesta incluye el desarrollo de un sistema de pastoreo adecuado y después usar el sistema correctamente. Los ajustes de la tasa de uso son muy difíciles hacer porque, en la mayoría de los escenarios, significa bajar el número de vacas.

Las vacas son productos de años de selección y evaluación cuidadosa, así que despidiéndose de las vacas significa despedirse de una parte de uno mismo, lo cual no es fácil hacer. Sin embargo, hay algunas cosas en que pensar para hacer el proceso más sencillo.

Los toros incapaces de preñar las vacas son inútiles, así que los toros infértiles se deben vender. Asimismo, las vacas que no logran preñarse se deben vender. El valor mayor de una vaca infértil es de lo que se recupera de su venta. Tal como los toros, las vacas abiertas simplemente comen bien, compiten mejor y producen grasa. No son el producto de un sistema de carne de res rentable y enfocado en el consumidor.

Los toros que no preñan cuestan dinero y también lo hacen las vacas que no crían un becerro temprano en la temporada de parto bovino. Un caso en particular para este razonamiento es que la alimentación se predice ser escasa este año. No vale la pena vivir negándolo. No hay cabida en el pastizal para el ganado infértil.

La detección anticipada de vacas abiertas o de parto tardío, a pesar de la razón, puede resultar en un grupo potencial de ganado para la matanza selectiva. Las cotas de referencia de CHAPS indican que 6.5 por ciento de la manada típicamente está abierta y 4.7 por ciento de las vacas usualmente tienen parto muy tardíamente. Muy tarde se define como después de los primeros 63 días, o para los propósitos prácticos, dos meses después del comienzo de la temporada de parto bovino. Combinados, estos dos grupos de vacas constan de más de 11 por ciento de la manada y serían un corte muy lógico al parecer muy escasos los pastizales y alimentos.

Lo único uno necesita para categorizar las vacas de parto tardío es un libro de parto bovino bueno o, para algunos, un pastizal extra. Llame al veterinario y fije la fecha del ultrasonido para la detección anticipada de preñez.

Si la situación de los alimentos parece más sombría, típicamente más de 11 por ciento de las vacas dan a luz después del día 42 de la temporada de parto pero antes del día 64. Aunque es más difícil decidir, este grupo de vacas también podría hacer un viaje al pueblo, con el destino final del pastizal de parto de alguien que prefiere vacas con parto más tardío.

Otro buen grupo de ganado para evaluar temprano son las vaquillas de un año. Planee un ultrasonido anticipado porque sólo 72 por ciento de las vaquillas de un año tienen becerros dentro de 21 días del comienzo de la temporada de parto bovino y 86 por ciento dentro de 42 días del comienzo de la temporada de parto.


Parece haber un poco de pena al repetir los apuntes, pero la infertilidad sencillamente necesita ser desviado del sistema de ganado de carne, y durante una sequía es un tiempo bueno para destacar el punto. Aunque los productores aun no saben la suerte de la estación de pastoreo este año, soltar el ganado a los pastizales con sólo la esperanza en el bolsillo de uno empeora la situación. La razón es que cada vaca come y ninguna vaca planea con anticipación para mañana. Todas comen y no racionan a sí mismas.

Si una estación seca sigue, más bocas más temprano significan menos bocas después. ¿Por qué no planear en vez de reaccionar? Espero que esto ayude y le dé razón de pensar y espacio para que las vacas coman durante los tiempos secos, tal como en los tiempos buenos.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.



¿Demasiadas vacas para los pastizales secos? Una sugerencia repentina para reducir el inventario: Cotas de referencia típicas de CHAPS: 6.5% de la manada está abierta típicamente; 4.7% de las vacas típicamente tienen parto bovino muy tardíamente. ¡Encuentre esas vacas y véndalas!