

Clasifique sus vacas. Póngalas donde pertenecen.

El Hablaganados 790: Ya es la hora de ahorrar los costos de alimentación

De Kris Ringwall, Especialista de ganado, Servicio por Extensión de NDSU
Traducción de Dr. Michael Cartmill, Dixie State University

Cuando los costos de alimentación son demasiado altos, considere vender las vacas más caras de mantener.

Ya es la hora de hacer los ajustes necesarios para el futuro de su manada de vacas.

La vaca va más lenta. La vaca no está desafiada por el frío ni el calor; la vaca vive en un medio ambiente bastante neutral. Digamos que la vaca tiene un poco de tiempo libre. Esto es lo que hace una vaca feliz.

Hay pastoreo después de la cosecha, caminando por los campos y vagando por un surtido de forrajes, ocasionalmente recogiendo un poco de granos desparramados, y acumulando los alimentos en el rumen, donde empieza el proceso de convertirse en proteína u otros productos nosotros, como humanos, usamos. Estos productos encuentran el camino en nuestra cadena alimenticia al mantener la vaca como la fuente de producción, manteniéndola en forma o directamente como aumento de peso en el cultivo de becerros este año.

Puede que no todos los productores de ganado tengan disponible el pastoreo después de la cosecha, pero todavía deben buscar la oportunidad. Desafortunadamente, el agua, la cerca, el transporte, las instalaciones, los vecinos, los caminos y otros hábitats no ganaderos a menudo limitan la oportunidad. Sin embargo, con el énfasis elevado en la salud de la tierra y cultivos de cobertura, un productor debe buscar un sitio y simplemente desarrollarlo para el propósito del pastoreo de estación tardía, utilizando los acres y acres de pastoreo después de la cosecha.

Pero a pesar de todo, el punto de producción principal de hoy es que las vacas recuperarán la condición de cuerpo más fácilmente cuando las demandas de producción son bajas. Por ejemplo, una vaca con leche moderada de 1,300 libras necesita unas 30 libras de heno bueno y verde por día antes del destete. Después del destete, esa misma vaca solo necesitaría 26 a 27 libras de ese mismo heno.

En otras palabras, la vaca ya no lacta y no necesita los alimentos. Si los alimentos, tal como el pastoreo después de la cosecha en otoño, se ofrecen, la vaca tiene la capacidad de comer más que necesita y guardará los alimentos extras como condición de cuerpo mejorada.

El pastoreo después de la cosecha usualmente es abundante. Tal como el productor que come en el bufet local cada día, el aumento de peso llegará a ser evidente. Tal vez no sea bueno para el productor, pero para la vaca, con tal de que no se engorde demasiado, ella añade el peso que

necesita para el invierno, permitiendo el crecimiento amplio del becerro durante el tercer trimestre y estabilizando la condición de cuerpo para lactar y fecundarse de nuevo la siguiente primavera.

Si los alimentos no están abundantes, clasifique las vacas y quite los alimentos de las vacas bien acondicionadas y délos a las vacas delgadas. Al clasificar las vacas, las vacas delgadas deben responder con un aumento de condición, así estando mejor preparadas para el invierno y el parto del próximo año sin competir con las vacas bien acondicionadas dentro de la manada.

Sin embargo, clasificar a menudo consume mucho tiempo, y dados los acres de los campos de cultivos, generalmente el espacio es adecuado para simplemente permitir que todas las vacas disfruten del pastoreo de otoño.

Al caer el otoño al invierno, una visita con el nutricionista local siempre es aconsejable. Unas cuantas libras de un buen suplemento de proteína mejorará la digestión y la utilidad de forrajes de baja calidad que las vacas pastorean.

El tamaño de vaca es otro punto de discusión, y el otoño es una oportunidad excelente para evaluar la condición de los varios tamaños de vacas dentro de la manada, tomándose en cuenta cómo vacas individuales han adaptado al medio ambiente local de la unidad de producción.

Hay vacas grandes, y vacas medianas y vacas más pequeñas. Hay vacas que prefieren comer en comederos y vacas que preferirían caminar una milla para su almuerzo. Hay vacas que podrían llenar el cubo de lecho en el otoño y las que dejaron de lactar e introdujeron a sus becerros a los alimentos de afuera a finales del verano. Todos estos tipos de vacas existen en las manadas por el área, dado que muchas vacas no se seleccionan por rasgos específicos que bajan costos sino rasgos bastante específicos que aumentan la producción.

Esto de verdad es algo en que pensar al empezar a llegar las cuentas de alimentación del invierno. ¿Está apareciendo el aumento de producción de verdad como efectivo en el banco? Si no, se necesitan discutir más preguntas.

Además, la información que se sabe en cuanto a la eficacia de vacas relativo a disminuir los costos de alimentación no está fácilmente implementada en muchas manadas de vacas. Así que para la manada típica y el productor típico, ¿por qué no usar la condición de cuerpo para reconocer las vacas que indican la necesidad de más insumos?

Dicho sencillamente, si una vaca no puede mantener la condición durante el verano y parece estar esperando un bushel de suplemento para recuperar peso, tal vez necesita encontrar su ruta más allá en el camino. Si llega la hora cuando el costo de insumos es más que lo deseado, piense en vender las vacas más caras de mantener por lo visto como un esfuerzo de bajar los costos de alimentación totales.

En conclusión, ya es la hora de poner más condición a las vacas delgadas. Vacas delgadas serán más delgadas en la primavera y no competirán. No espere; ponga condición en ellas ahora cuando el tiempo es debido y los dólares más pequeños.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Para más información, contacte <https://www.ag.ndsu.edu/news> o el Servicio por Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, NDSU Dept. 7000, 315 Morrill Hall. P.O. Box 6050, Fargo, ND 58108-6050.