
El Hablaganados 4: Prepárese ahora para las temporadas de becerros futuras

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado
Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard,
Dickinson State University

Las vacas abiertas (no preñadas) y cómo prevenir contra ellas es y siempre ha sido un tema de discusión dentro de la industria de ganado.

He llegado a darme cuenta de que si un productor realmente va a hacer algo en cuanto a ese problema debe hacerlo ahora. ¿Por qué? Hay que parar y pensarlo. ¿Cuándo es el único tiempo cuando la vaca no hace mucho? Para mí, esto ocurre inmediatamente después de destetar el becerro.

Para los productores de las praderas norteñas los cuales tienen sus temporadas de parir desde febrero hasta abril, esto coincidiría con los meses venideros tardes en el otoño. Para el Centro de Investigación de Extensión Universitaria de Dickinson, desde los mediados de octubre hasta los mediados de noviembre es la temporada del destete.

Para muchas manadas de ganado, se da mucha atención a los becerros en esta temporada del año. Mientras tanto, se sueltan las vacas para alimentarse a sí mismas hasta que empiece a caer la nieve, generalmente unos treinta días después. Este tiempo, sin embargo, es la oportunidad de mejorar la condición de la vaca. El becerro está destetado. Ella debe estar a mediados del segundo trimestre de gestación y no está luchando contra el tiempo frío de invierno. Estas vacas necesitan energía para ganar de nuevo algo de la condición que se perdió debida a la buena producción. También necesitan bastante proteína para utilizar efectivamente el forraje.

Hay que eliminar la especulación. Pese sus vacas cuando los becerros se destetan y cuando empieza a alimentarlas para el invierno. ¿Demuestra el valor de su punto de referencia una ganancia o una pérdida de peso? Si las vacas perdieron peso, usted ha perdido el período de la vida de la vaca cuando el progreso significativo se puede hacer para mejorar la condición de las vacas que lo necesitan.

La tasa de preñez de promedio para las manadas usando CHAPS (Evaluación del rendimiento de la manada de ganado por Software) está a 92,9% por los últimos cinco años. La tercera superior estaba a 94,4%, la tercera mediana a 93,7% y la tercera inferior a 91,3% cuando dividieron las manadas basándose en el peso de destete ajustado por la edad por vaca expuesta.

El significado de estas estadísticas es que las manadas que destetaron el mayor peso por vaca expuesta tenían una tasa de preñez de 94,4%. Las manadas superiores están terminando la temporada de reproducción y empezando el último trimestre de preñez con tres becerros adicionales por cada cien vacas. Para nuestros productores típicos, esto sería en exceso de nueve becerros.

Hay que vigilar los costos adicionales para que no excedan el valor de los becerros adicionales. Un productor puede dar de-

masiado de comer y gastar demasiado dinero, pero eso no es lo normal.

Los datos de CHAPS demuestran que los productores superiores tendrán una gama de 97,2% a 91,6% para la tasa de preñez para sus vacas en el otoño. Aun habrá años cuando 100% de las vacas están preñadas. Esto es muy diferente a los productores inferiores los cuales tendrán una gama de 95,4% a 87,2% para sus vacas preñadas en el otoño.

En el negocio de ganado de hoy, 90% de las vacas preñadas debe ser el límite bajo y 95% debe ser la meta. El grupo mediano sólo ha alcanzado esta meta dos veces en esta década.

En cuanto a la tasa de parir, no eche ud. la culpa al mal tiempo de la primavera. Trabaje este otoño para sacar de las vacas lo que invirtió en sus becerros esta primavera. El fracaso del toro y la salud de la manada pueden ser problemáticos, pero primero hay que averiguar cómo es la condición de las vacas. Si su tasa de preñez está más baja que su meta, ahora es cuando se debe ajustar su administración.

Mi consejo: Evalúen la preñez de esas vacas ahora, separe las vacas flacas y deles de comer. No suponga que las vacas medianas y superiores pueden mantenerse en las praderas o los campos de cosecha secos. Comienza un programa de averiguaciones del forraje y provea una dieta multinutricional para todas las vacas. Usted verá el beneficio de hacer esto el año que viene.


Espero que usted encuentre todas sus etiquetas de oreja(caravanas).

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103
kringwal@ndsuxext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136
richard.mattern@ndsu.edu

CHAPS Pregnancy Percentage



Herds sorted by age-adjusted weight weaned per exposed female.