



El Hablagaanados 132: Las novillas ya han hecho la mitad del trabajo antes que la fecha de parir esperada

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Ya nos quedan menos de tres semanas hasta que el invierno se acabe y las temperaturas bajísimas están cambiando un invierno que ha estado bastante templado. La temperatura de -35 grados que se reportó hace unos días nos hizo pensar en los productores que ya tienen vacas que están pariendo.

2003 Current Calving Statistics	
Predicted calving start date	February 23
Actual calving start date	February 14
Calved by predicted start date	50 %
Current average birth weight	74.5 pounds
Heifers with difficult pulls	12 %
NDSU Dickinson Research Extension Center	

A los finales de la semana pasada, la anticipación de la temporada de parir cedió a la temporada misma. Para mí era interesante que las novillas fueran a parir empezando el 23 de febrero. La primavera pasada, cuando el tiempo estaba fresco y tibio, las novillas recibieron una inyección de prostaglandin el 13 de mayo, con la reproducción activa comenzando el 15 de mayo y continuando hasta el 17 de mayo.

Basado en una tabla de gestación de 283 días, se planeó el suceso grande. No obstante, no se puede predecir nunca la Madre Naturaleza. De repente, este año las novillas comenzaron nueve días temprano: tres becerros por la tarde el viernes, el 14 de febrero, y seis más el día siguiente. Los nacimientos han continuado: seis parieron el domingo; cinco becerros paridos el lunes; ocho parieron el martes; siete parieron el miércoles; ocho el jueves; y catorce el viernes; llevando la suma a 57 becerros que nacieron antes de la fecha que debían según la tabla.

Sesenta novillas ya han parido antes de la fecha esperada (283 días después de criar), así que el proceso debe ser más fácil este año. No necesitaremos tantos corrales para los becerros con 57 de las 120 novillas que iban a parir ya paridas. (Perdone el sarcasmo, pero la vaca continúa estando un paso más adelantado que la tecnología).

Por lo general, la temporada va bien, con sólo siete patos difíciles. El peso de nacimiento medio ha sido 74,5 libras, con seis becerros pesando 90 o más libras. De los becerros más pesados, dos fueron tirones difíciles se criaron por dos de los toros que utilizamos la primavera anterior. Cinco becerros han muerto: uno murió de la mala presentación, dos vinieron de dos juegos de gemelos, uno parió difícilmente y el último nació debajo de la cerca.

A pesar de un esfuerzo riguroso de hacer parir las novillas con éxito, el fracaso nunca está muy lejos. Cada becerro que muere lleva una parte del administrador consigo. Si los problemas pueden ocurrir, ocurrirán, y las ramificaciones son frustrantes. Pero en el negocio de producir los becerros, siempre hay otra vaca, y el tiempo sigue marchando. Obviamente, el futuro es el único destino, y la evaluación de los toros de este año ayuda en la selección de los toros del año próximo.

La mayoría de los becerros que vienen de las novillas de este año son productos de tres toros Angus: AAA 11783725, AAA 13384754 y AAA 10312571. Estos toros tienen valore de EPD para el

peso de nacimiento de -0,3, +2,0 y +0.0, respectivamente. En los años anteriores estos toros produjeron pesos de nacimiento medios de 75 libras, 75 libras y 81 libras, respectivamente.

Dado el peso de nacimiento medio es 74,5 libras este año para la manada del Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson, podemos predecir cómo utilizar estos toros con las novillas resultará. El Centro continuará a seleccionar los toros según la facilidad de parir basado en el valor de la EPD de los toros. Los tres toros son todos A1 con mucha certeza. Dos de los toros tienen valores de certeza de más de 0,99 y el otro toro tiene una certeza de 0,84 para el peso de nacimiento.

Los toros de un año no tienen los valores de certeza alta de los toros probados A1. Pero, no obstante, las dificultades de parir mayores pueden reducirse a un suceso poco frecuente cuando los toros apropiados con la genética probada se seleccionan. Por utilizar las EPDs más bajas para el peso de nacimiento, el índice de dificultad de parir con los toros de un año puede reducirse.

Los productores se dan cuenta que cada vaca y becerro son singulares, y ninguna cantidad de planes puede eliminar totalmente problemas con el parto. El parto es un proceso natural para empezar la vida fuera del útero, y la vida no viene sin el riesgo, aún al empezar.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu