

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)




El Hablaganados 309: La sequia y la infertilidad - encuentre usted las vacas fértiles y venda usted los demás

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Hace unas semanas, mientras los toros se iban para las pasturas, un requisito absoluto era la fertilidad. Los toros que no reproducen bien no son útiles y con la escasez actual de comida, pueden comprometer el sistema.

De la misma manera, las vacas que no se preñan son similares. El valor mayor que tiene una vaca abierta es la recuperación porque comen bien, compiten mejor y producen grasa, lo cual no es el producto deseado de un sistema de carne de vaca orientado hacia el consumidor y que es rentable.



6.6 %	Open cows
5.4 %	Cows calving after 63 days
8.2 %	Cows calving between 42 and 63 days
14.0 %	Heifers calving 21 days
15.0 %	Heifers calving within 42 days

Availability based on infertility or poor fertility if food is short.

Los toros que no reproducen bien cuestan dinero. Así también las vacas que no se preñan temprano. No hay mucha comida disponible, y no se debe vivir en la negación. No hay lugar en las pasturas para el ganado infértil.

Detectar temprano una vaca abierta (no preñada) o las que paren tarde en la temporada le da al productor un grupo potencial del cual deshacerse por medio de la venta. Los puntos de referencia para (CHAPS) Software para la Evaluación del Rendimiento de la Manada de Ganado indican que 6,6% de la manada típicamente está abierta y que 5,4% de las vacas típicamente paren muy tarde, algo que se define como 63 días después del comienzo de la temporada de parir.

Estos dos grupos de vacas son el 12% de la manada y serían una reducción lógica hoy puesto que las pasturas están bien secas y hay una falta de comida. Otro 8,2% de las vacas producen becerros entre el 42 y el 63 día de la temporada de parir. Este grupo podría hacer un viaje a la casa de venta, después del cual estarían en las pasturas de otra gente.

Las novillas son otro grupo que valdría la pena revisar. Los datos de CHAPS indican que sólo 71% producen becerros dentro de 21 días y 85% dentro de los primeros 42 días de la temporada de parir. Así, vale la pena investigarlas.

Lo esencial es sencillo. Llame su veterinario y fije una fecha para la prueba de ultrasonido para que tenga una idea de la gama de parir para poder deshacerse de algunas según la disponibilidad de comida y el rendimiento. Las vacas infértiles y las que paren muy tarde tiene un impacto para su operación semejante al impacto que tienen los toros infértiles.

Recientemente, un productor me preguntó de dónde yo había sacado la cantidad de \$40 por día que un toro infértil le cuesta a la operación. El valor de \$40, calculado según la aritmética vaquera, es un punto de referencia de CHAPS (Chaps2000.com , haga clic en los puntos de referencia) para el promedio de ganancia diaria de 2,38 libras por día para los becerros multiplicado por el porcentaje de vacas ciclando en cualquier día (suponiendo que todas las vacas tienen la oportunidad igual para ciclar y reproducir) multiplicado por 21 días (reflejando los días antes de otra oportunidad para emparejarse con un toro si la oportunidad le había faltado anteriormente).

En cualquier día, 4,76% (un día dividido por 21 días) de las vacas deben estar ciclando. Por eso, si un toro no es fértil en ese día, la oportunidad de concebir un becerro se pierde. Si un toro está en las pasturas con 30 vacas, 1,43 vacas deben estar ciclando cada día. Si el toro infértil pierde la oportunidad de engendrar 1,43 becerros y pierde 21 días de ganancia a 2,38 libras por día, se pierde 71,47 libras de becerro.

Volviendo a los puntos de referencia de CHAPS, en realidad, sólo 62,4% de las vacas están ciclando durante los primeros 21 días. Aproximadamente 70 libras de becerro se pierde para 60% de las vacas. A \$1 por libra de becerro a lo largo, el número final parece ser un poco más de \$40 por día por toro infértil. Obviamente, los precios altos del mercado subirán el número y el peso o tiempo de marketing también tendrá un impacto en el número, y allí está dónde entra en juego la aritmética vaquera.

Por otro lado, \$40 puede ser el valor de heno por un mes para una vaca preñada. Repito otra vez que hay que remover los animales infértiles del sistema administrativo. Durante una sequia es el tiempo propicio para hacer este punto. Espero que esto le ayude al productor y que le dé algo en que pensar en los tiempos difíciles.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.Beef-Talk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association (la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuxext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu