



El Hablagaanados 447: ¿Por qué siempre hablamos del toro después de lo demás?

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

La cosecha de becerros de 2009 no está llegando tan rápidamente como esperamos. Esto no es de todo malo porque el tiempo frío no era propicio para su llegada.

No obstante, si uno desea empezar a parir los becerros el 1 de marzo, entonces se necesita empezar el primero de marzo o de abril o en cualquier otra fecha que ha escogido. Típicamente, las primeras dos terceras de la cosecha de becerros debe nacer dentro de tres semanas de la fecha escogida.



Ésta es un punto de referencia para los miembros de la Asociación del Mejoramiento de Ganado para la Carne de Res de Dakota de Norte (NDBCIA). Los miembros alcanzan su meta y habrán parido a eso de 90% de becerros dentro de las primeras seis semanas.

En realidad, una manada productiva tendrá varias vacas que han parido antes e la fecha escogida y los partos deben aumentarse por tres semanas y luego rápida y gradualmente van a disminuir. Crear tal manada no es una tarea fácil y un entendimiento básico de la reproducción de ganado ayuda.

Típicamente, el ciclo de estro de una vaca empieza cada 21 días, así que hay 5% de ellas que están en estro durante la temporada de reproducción en cualquier día. Asimismo, se puede esperar que 5% de vacas esté pariendo en cualquier día de la temporada de producir los becerros.

La duración de gestación típica para las vacas es 281 a 285 días o una duración muy cerca de esa figura, pero depende de la raza de ganado. Esto sólo deja 80 a 85 días (más o menos) desde el día en el cual la vaca pare para concebir un becerro para el año entrante. Como el canguro, como muchas veces se oye decir “siempre hay uno en la bolsa abdominal,” lo mismo es verdad para una vaca nueve meses del año.

Observe esas vacas después del parto y empiece a tomar apuntes. Las vacas que paren deben entrar en estro dentro de 60 días de parir.

Esto es importante porque cuando se suelta el toro a las vacas, Las vacas deben estar en su segundo ciclo de estro después del parto y estar listas para aparearse. Aliméntelas y cuídelas bien y todo debe salir bien.

Acuérdese del toro. Él tiene que salir bien de una prueba de capacidad reproductiva y ser fértil antes de que lo suelten a las vacas. El comentario “las vacas no parieron tan pronto como deben” es un problema que viene del año pasado.

En un toro una célula de semen y sólo uno se encontrará con un huevo soltado y concebirá vida nueva. Esa célula de semen era sencillamente una célula hasta que el sistema del toro indicó que debía de hacerse una célula de semen y tener la oportunidad de competir con muchos de sus compañeros de cuarto para convertirse en padre.

Y esto no ocurre de día a noche. Requiere 54 días para convertirse en una célula de semen madura y sana, capaz de nadar la distancia para fertilizar el huevo.

La moraleja es estar seguro de tener los toros en buena forma por lo menos 2 meses antes de la temporada de aparearse. Aliméntelos, cuídelos y prepárelos para el destino singular que tienen --- aparearse y empreñar a las vacas. El fracaso de hacer esas dos cosas es terminal y le cuesta demasiado al dueño.

Mientras el enfoque actual está en los becerros, es la hora de hacer caso y desarrollar algunas esperanzas para la estación de criar que viene. Se necesitan dos, el toro y la vaca. Si hay un fracaso de parte de uno, hay un fracaso para la operación y especialmente el toro.

Cuando se suelta un toro a 30 vacas, el resultado esperado es 30 becerros y sólo un toro fértil y capaz físicamente puede producir esa meta. No espere; vaya inmediatamente al corral de los toros y evalúe los padres potenciales.

Recuerde, lo que usted hace hoy le va a dar toros que están a la cumbre de fertilidad a los 80 días del comienzo de la temporada de parir los becerros.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuxext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu