

El Hablaganados 549: Ponga en forma a esos toros ahora

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

No hay remedio instantáneo para la fertilidad pobre de toros.

El corral de toros puede ser ese corral tras el granero del que se olvida al empezar el parto bovino. Un ojo cuidadoso vigila a las vacas de la salida del sol hasta la siguiente, pero puede que a los toros sólo les dé de comer. De hecho, puede que nos estén mirando más que nosotros a ellos.

Sin embargo, la cosecha de becerros del próximo año se arriesga y esos toros necesitan estar listos para soltarse. Al soltar los toros, se espera que el toro sea sano físicamente y fértil. Del aspecto administrativo, los administradores necesitan comprender que, sin duda, ninguna de estas dos expectativas se puede cumplir al asistir a un curso de tan sólo dos semanas y volver a casa con un remedio instantáneo.

Si uno no está convencido, váyase al gimnasio. Empezando ahora, o por lo menos dos meses antes que piensa soltar los toros, la administración necesita enfocarse en los toros, tal como las vacas y becerros. La salud del toro es una función de la condición corporal total. Tal vez el estado físico mejor se mide al sencillamente observar la condición corporal en los toros. No obstante, aun eso no es fácil. Aumentar el consumo de energía para el toro puede aumentar la grasa corporal, pero dese cuenta de que estos toros no se destinan para la barrera de cosecha. Al contrario, los toros van al pastizal de apareamiento, así que no necesitan mucha grasa.

El condicionamiento del toro necesita seguir una línea fina entre mejorar la condición corporal y no añadir grasa. Unos lo llamarían ponerse en forma. Tal vez uno no necesita contratar a un entrenador, pero téngase presente que el equilibrio entre la actividad y la nutrición es importante. Un buen consultor nutricional ayudaría. Es por eso que ahora es el tiempo de asegurar que los toros sean condicionados adecuadamente.

Similarmente, no hay remedio instantáneo para la fertilidad pobre de toros. La espermatogénesis es un proceso de aproximadamente dos meses desde el comienzo hasta el fin. Células de esperma viables y agresivas no se producen de la noche a la mañana. Si los toros están estresados, subalimentados o enfermos, la espermatogénesis puede ser interrumpida o puede parar.

En tales casos, estos toros pueden dar pruebas malas o tener períodos de fertilidad baja más tarde en la temporada de apareamiento. La espermatogénesis en el varón es similar a un proceso de una línea de montaje. Al producir espermatozoides, progresan por una línea de montaje muy larga al juntar varias partes. Tal como se ha notado previamente, del inicio real de la espermatogénesis hasta el espermatozoide terminado es un proceso que dura unos dos meses. En cualquier época en que se para la línea de montaje, el resultado será menos espermatozoides disponibles dos meses después.

Este atraso de producción a menudo se ha olvidado ya hace tiempo una vez que los toros se sueltan al pastizal. Afortunadamente, como todas las cosas vivientes, hay apoyos, tal como múltiples líneas de montaje de espermatozoides en producción a diferentes horas. Sin embargo, la producción máxima puede ser disminuida. Si el estrés, desnutrición o problemas de salud son lo bastante severos, el resultado son vacas abiertas en el otoño. Uno no puede hacer bastante hincapié en este atraso de tiempo de fertilidad, así que la necesidad de empezar a vigilar los toros es ahora.

Esos toros nuevos de un año probablemente reciben mucha atención, pero no se olvide de los toros mayores. Pruebas de la salud de reproducción, tal como evaluación al pesar y condicionar deben ser planeadas y apuntadas en el horario. Aunque no siempre estén disponibles, si uno tiene las cifras de peso del otoño para los toros, su progreso invernal se puede medir mejor. El otoño pasado en el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, los dos toros de tres años que se guardaron tuvieron un promedio un poquito más bajo de 1,660 libras. Los toros de un año que se acercaban a cumplir dos años tuvieron un promedio un poco más arriba de 1,340 libras.

Básicamente, todos los toros deseables tuvieron una calificación de condición corporal de 6. Estos toros deseables habían estado vagando en el pastizal con los otros toros, así que uno esperaría una calificación de condición de 6. Algunos habrían salido más delgados del pastizal de apareamiento, pero tuvieron tiempo de ganar su carne de nuevo, así que todavía deben tener una calificación de condición de 6.

Para los que no están familiarizados con el sistema de calificación de condición, los toros con calificaciones de condición corporal de 3 o menos serían delgados y tendrían rasgos del esqueleto evidentes. Las calificaciones de condición corporal de 4 a 6 son toros que expresan una forma de esqueleto y músculos normales sin evidencia de grasa excesiva o secciones de grasa. Calificación de condición de 7 a 10 es ganado que tiene capa de grasa obvia. Es más obvio al acercarse el toro a una calificación de condición corporal de 10.


Dado un ojo afinado para la condición corporal adecuada y una expectativa de que la mayoría de los toros puedan aumentar 300 libras por año de músculo, los toros deben estar listos para la estación de apareamiento.

Se necesita ocuparse de los toros que son mal condicionados o demasiado condicionados o que faltan energía ahora mismo. No espere porque el castigo es la fertilidad baja y vacas abiertas.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.



Es hora de poner en forma al corral de toros.