

El Hablagnados 659: La zona de transición no es oportuna para el parto bovino

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

La humedad ha venido en la forma de lluvia, aguanieve y nieve. Aun en los días buenos, el tiempo ha desafiado a los productores, así que la vigilancia debe ser constante.

La temporada de parto bovino se acaba para muchos productores, pero las últimas dos semanas eran duras. Los problemas venían de muchas direcciones. En todos aspectos de la vida, siempre hay una zona de transición. En el negocio de ganado, una de las más obvias transiciones es de invierno a verano. La primavera es un tiempo bueno, pero el clima cambiante puede ser maravilloso o desastroso o todo entremedio.

Históricamente, los productores que tienen sus vacas con parto en la primavera han intentado evitar la transición de invierno a verano. Sin embargo, la gran mayoría de productores ven sus vacas dar a luz bajo el auspicio del invierno tardío.

Al repasar los datos de los miembros de la Asociación del Mejoramiento del Ganado Bovino de Carne de Dakota del Norte que procesan sus datos vacunos por el Servicio por Extensión de NDSU usando el programa CHAPS, el período máximo para el parto bovino es la última semana de marzo hasta la primera semana de abril. Muchos becerros nacen en ese tiempo y están listos para el pasto de estación fresca más o menos por el primero de mayo.

Las razones por eso son sencillas. Mientras el suelo está congelado o por lo menos medio congelado, un medio ambiente adecuado se puede mantener para las vacas al dar a luz. Junto con la estación a finales de invierno, la mayoría de productores han invertido en el equipo e instalaciones necesarios para asegurar una temporada de parto exitosa. El proceso ha funcionado porque los productores han podido trabajar lado a lado con la Madre Naturaleza para tener temporadas de parto bovino exitosas.

Sin embargo, la primavera de 2013 es otro recordatorio fuerte que a veces la transición no se puede evitar. Este año, el patrón del tiempo ha sido mojado. La humedad ha venido en la forma de lluvia, aguanieve y nieve. Aun en los días buenos, el tiempo ha desafiado a los productores, así que la vigilancia debe ser constante.

Mantener la manada seca y en tierra seca no es un proceso simple. Lo bueno es que el tiempo mojado ayuda al pasto a crecer y a los becerros a subir de peso al comer el pasto. Lo desafortunado es que los becerros muertos no suben de peso.

A pesar en dónde vive el productor, el ciclo de la naturaleza siempre antecederá la producción de forraje copioso del verano con el tiempo impredecible. Al ser desafiado para definir el capricho del clima, se discutirá la primavera.

La temporada apropiada para el parto bovino es por lo menos un punto de discusión de los productores en la industria vaca-becerro. Hay productores que han invertido en equipo para aventajar a la Madre Naturaleza. Mientras tanto, algunos productores han elegido trabajar con la Madre Naturaleza y hacer que las vacas paran más tarde. Ambas opciones tienen que desarrollar planes administrativos y comerciales para apoderarse de valor de sus cosechas de becerros para pagar las cuentas y tener un poco de rentabilidad.

Los productores deben discernir ellos mismos lo que funciona. Sin embargo, el punto de esta discusión es sobre esos productores que están tratando de cambiar en pasos pequeños. En otras palabras, algunos productores están retrasando lentamente la fecha de soltar toros a una fecha más tardía. Estos productores a menudo se encuentran atrapados en la "zona de transición," lo que es lo peor de ambos mundos porque se acaban con costos de aportación más altos y menos rendimiento.

Cambiar las fechas del parto es una de las decisiones más esenciales que un productor vaca-becerro hará porque todo gira alrededor del parto bovino. El Centro de Investigación por Extensión en Dickinson tenía las fechas de parto bovino empezando la tercera semana de marzo. El año pasado, el Centro movió la fecha de parto a la tercera semana en mayo. Este año, el comienzo de la temporada de parto es la segunda semana de mayo.

Tal como muchos dentro de la industria, la postergación era grave porque el Centro está diseñado y equipado para comenzar la temporada de parto en marzo o aún más temprano. Las instalaciones y equipo están disponibles y de verdad funcionan.

La mano de obra disponible es la cuestión para muchas operaciones vaca-becerro. Al cambiar los tiempos, hay menos gente presente que tiene un deseo fuerte de trabajar en los corrales de parto. Las habilidades y sentido extra necesarios no se encuentran fácilmente en el lugar de trabajo.

Como muchos productores, el Centro lentamente empezaba a preguntar cuándo comenzar la temporada de parto. Al final, no había mucho apoyo para postergar la temporada de parto hasta abril. El tiempo típico de abril era placentero, pero todos en el aula tuvieron varios recuerdos de lo que puede pasar en abril cuando la Madre Naturaleza decide usar abril para la transición de invierno a verano.


A causa de ese escenario, se eligió mayo. La segunda semana de mayo se seleccionó para ayudar a minimizar cualquier parto antes de soltar las vacas en la primavera. El Centro tiene mucho que aprender sobre el parto más tardío. Sin embargo, por lo menos por estas últimas semanas, los trabajadores han estado ocupados alistándose para la temporada de parto en vez de jalar becerros de nieve amontonada y luchando con corrales lodosos, vacas malhumoradas y becerros enfermos.

Los que estamos en el Centro todavía estamos aprendiendo, pero estamos progresando.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.



La zona de transición: Cambiar las fechas del parto bovino puede poner a los productores en la estación turbulenta entre el invierno y el verano

